

# Brøndby Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.500 personer i kommunen)	5	6	6	5	4	6	6
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (4.500 personer i kommunen)	18	18	19	17	20	16	17
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.100 personer i kommunen)	16	18	15	20	10	18	27
Ensomhed # (3.500 personer i kommunen)	13	14	13	14	21	11	11
Høj score på stressskala # (8.700 personer i kommunen)	30	33	29	38	44	30	29
Daglig rygning # (4.400 personer i kommunen)	13	17	16	17	18	18	12
E-cigaretter # (1.500 personer i kommunen)	3	6	7	4	6	8	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (600 personer i kommunen)	3	2	4	1	7	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.500 personer i kommunen)	7	6	7	5	5	5	10
Rusdrikker ugentligt # (2.000 personer i kommunen)	12	8	12	4	6	9	8
Usundt kostmønster # (5.800 personer i kommunen)	14	22	26	19	23	22	22
Lav fysisk aktivitet # (6.600 personer i kommunen)	18	26	25	26	27	21	33
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (13.200 personer i kommunen)	62	56	57	55	74	56	33
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (9.000 personer i kommunen)	35	39	42	36	44	33	46
Inaktiv transport ** ## (4.200 personer i kommunen)	27	28	30	26	25	30	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (8.700 personer i kommunen)	32	34	40	27	22	38	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.100 personer i kommunen)	15	24	24	23	19	28	21
Meget generet af søvnproblemer # (4.400 personer i kommunen)	14	17	14	19	19	16	15

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Brøndby Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.500 personer i kommunen)	5,3	8,6	9,3	8,0	0,9	8,0	19,0
Hjertesygdom ** (1.400 personer i kommunen)	3,6	4,8	5,8	3,9	0,1	2,7	14,7
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,7	2,8	2,5	=	1,7	7,6
Kræft *** (1.100 personer i kommunen)	3,7	4,0	3,5	4,5	0,2	3,0	10,4
KOL * (1.400 personer i kommunen)	4,7	5,0	4,4	5,6	=	4,3	12,4
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,1	7,1	5,7	8,4	4,9	7,1	9,6
Allergi – selvrapporeret ## (8.100 personer i kommunen)	31,3	30,9	29,5	32,3	36,0	31,2	24,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,7	2,0	1,8	2,1	0,5	2,0	3,8
Slidgigt – selvrapporeret # (6.800 personer i kommunen)	19,2	25,7	19,5	31,7	3,2	25,6	50,7
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	12,7	17,3	17,9	16,7	8,3	18,8	24,2
Knogleskørhed ** (1.000 personer i kommunen)	2,7	3,3	1,1	5,5	=	1,5	11,0
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.100 personer i kommunen)	16,8	19,4	11,7	27,0	23,4	21,4	10,9
Depression ** (2.000 personer i kommunen)	6,4	7,0	5,1	8,8	3,2	7,8	9,8
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	3,6	3,9	2,7	5,1	4,2	4,3	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,4	3,7	3,1	4,3			3,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Brøndby Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.800 personer i kommunen)	5	6	7	6	5	7	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.800 personer i kommunen)	15	20	17	24	9	22	28
Ensomhed ## (3.100 personer i kommunen)	8	11	9	13	14	11	7
Høj score på stressskala # (8.400 personer i kommunen)	25	31	25	36	35	31	25
Daglig rygning # (5.200 personer i kommunen)	16	18	22	15	21	20	12
E-cigaretter ## (900 personer i kommunen)	3	3	4	2	3	5	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.000 personer i kommunen)	8	7	10	5	5	8	9
Rusdrikker ugentligt # (2.700 personer i kommunen)	14	10	13	6	8	11	8
Usundt kostmønster # (5.400 personer i kommunen)	12	20	24	15	19	18	22
Lav fysisk aktivitet ## (8.000 personer i kommunen)	19	29	30	28	32	26	33
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (15.100 personer i kommunen)	64	59	63	54	74	59	43
Skærmtid – 4 timer eller mere # (9.700 personer i kommunen)	31	39	44	34	43	34	45
Inaktiv transport ** ## (3.600 personer i kommunen)	20	22	29	15	12	28	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.800 personer i kommunen)	31	39	44	33	34	40	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.200 personer i kommunen)	13	22	23	21	16	24	23
Meget generet af søvnproblemer # (5.100 personer i kommunen)	13	18	15	21	14	20	17

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Brøndby Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.400 personer i kommunen)	5,1	8,2	8,9	7,4	0,9	7,5	18,4
Hjertesygdom ** (1.500 personer i kommunen)	4,1	5,3	6,2	4,5	0,2	3,1	16,3
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,6	2,9	2,3	0,1	1,7	7,6
Kræft *** (1.000 personer i kommunen)	3,4	3,5	3,1	4,0	0,3	2,6	9,5
KOL * (1.400 personer i kommunen)	4,6	4,9	4,3	5,5	=	4,3	12,1
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,0	7,0	5,6	8,2	4,7	7,1	9,6
Allergi – selvrapporeret ## (8.100 personer i kommunen)	29,2	29,9	24,9	34,7	31,5	33,5	19,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,6	1,9	1,6	2,3	0,5	2,0	3,5
Slidgigt – selvrapporeret # (6.800 personer i kommunen)	18,0	24,2	19,1	29,1	2,9	21,2	50,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.000 personer i kommunen)	11,6	14,8	15,1	14,5	6,9	17,1	17,8
Knogleskørhed ** (1.000 personer i kommunen)	2,7	3,4	1,1	5,5	=	1,6	11,3
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.600 personer i kommunen)	16,0	20,8	14,2	27,4	22,5	23,7	13,3
Depression ** (2.300 personer i kommunen)	7,1	8,0	5,5	10,3	3,7	9,3	10,5
Angst ** (1.000 personer i kommunen)	3,0	3,4	2,5	4,3	3,3	3,9	2,4
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,6	4,2	3,7	4,6			4,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Brøndby Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.300 personer i kommunen)	13	20	17	22	11	20	28
Høj score på stressskala # (6.400 personer i kommunen)	21	26	21	30	32	24	23
Daglig rygning # (5.300 personer i kommunen)	15	19	21	18	15	23	18
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.000 personer i kommunen)	10	8	10	6	6	7	10
Rusdrikker ugentligt # (2.800 personer i kommunen)	15	11	15	7	15	10	7
Usundt kostmønster # (4.000 personer i kommunen)	10	16	20	12	17	14	16
Lav fysisk aktivitet # (6.100 personer i kommunen)	15	23	22	25	23	21	27
Inaktiv transport ** ## (4.300 personer i kommunen)	22	29	34	23	20	34	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.100 personer i kommunen)	30	35	40	29	24	40	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.600 personer i kommunen)	11	17	16	18	10	21	18
Meget generet af søvnproblemer # (4.200 personer i kommunen)	11	16	13	18	17	17	13

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Brøndby Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i kommunen)	4,9	7,4	8,1	6,7	0,8	6,9	16,2
Hjertesygdom ** (1.600 personer i kommunen)	4,3	5,9	6,7	5,1	0,2	3,8	17,2
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,7	2,2	=	1,7	7,0
Kræft *** (1.000 personer i kommunen)	3,2	3,4	3,1	3,7	0,4	2,4	9,3
KOL * (1.300 personer i kommunen)	4,3	4,6	4,0	5,2	=	4,1	11,1
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,0	7,3	5,7	8,8	5,1	7,1	10,4
Allergi – selvrapporeret ## (6.100 personer i kommunen)	27,5	23,7	22,4	24,9	19,2	27,5	20,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,4	1,8	1,4	2,1	0,5	1,9	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (6.300 personer i kommunen)	17,6	24,2	19,5	28,6	1,2	23,9	47,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.900 personer i kommunen)	12,2	15,1	17,2	13,0	6,7	18,1	18,5
Knogleskørhed ** (900 personer i kommunen)	2,6	3,2	1,0	5,2	=	1,3	10,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.000 personer i kommunen)	13,5	15,6	10,3	20,6	17,8	17,9	9,1
Depression ** (2.600 personer i kommunen)	8,1	9,2	6,2	12,0	4,8	10,5	11,6
Angst ** (900 personer i kommunen)	2,7	3,3	2,4	4,1	2,8	3,8	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	3,8	3,1	4,4			3,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Brøndby Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.500 personer i kommunen)	14	20	16	24	11	23	26
Høj score på stressskala ## (7.200 personer i kommunen)	22	28	22	34	31	27	26
Daglig rygning # (6.800 personer i kommunen)	19	26	29	23	26	30	18
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.300 personer i kommunen)	13	9	11	8	9	10	7
Usundt kostmønster # (4.200 personer i kommunen)	10	16	20	13	17	15	19
Lav fysisk aktivitet # (5.600 personer i kommunen)	14	21	21	22	18	19	29
Inaktiv transport ** ## (4.800 personer i kommunen)	24	31	40	21	21	37	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (8.700 personer i kommunen)	30	32	40	26	22	35	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.400 personer i kommunen)	11	17	17	16	10	20	16
Meget generet af søvnproblemer # (4.100 personer i kommunen)	11	15	11	19	15	16	15

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Brøndby Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Brøndby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	4,2	6,0	6,7	5,4	0,7	5,7	13,1
Hjertesygdom ** (1.600 personer i kommunen)	4,3	5,8	6,7	4,9	0,1	3,6	17,5
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,6	3,0	2,2	0,1	1,6	7,9
Kræft *** (900 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,0	3,7	0,3	2,3	9,2
KOL * (1.200 personer i kommunen)	3,9	4,5	3,9	5,1	=	4,1	11,0
Astma ** (2.100 personer i kommunen)	6,0	7,6	6,1	9,0	5,4	7,4	10,7
Allergi – selvrapporeret ## (6.000 personer i kommunen)	26,7	23,6	20,3	26,8	28,3	24,0	16,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,3	1,7	1,4	2,0	0,6	1,8	2,9
Slidgigt – selvrapporeret # (6.500 personer i kommunen)	17,7	24,7	18,3	30,2	2,2	24,8	49,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.000 personer i kommunen)	12,5	15,4	16,7	14,2	7,4	17,7	19,3
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,2	2,5	0,8	4,1	=	1,0	8,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.100 personer i kommunen)	15,6	19,8	14,6	24,6	20,1	24,6	8,6
Depression ** (2.300 personer i kommunen)	7,7	8,4	5,7	11,0	4,1	9,4	11,4
Angst ** (800 personer i kommunen)	2,4	2,9	1,8	3,8	2,6	3,1	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	4,1	3,3	4,7			4,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.