

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Lyngby-Taarbæk Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.300 personer i kommunen)	5	6	7	4	7	6	4
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (7.000 personer i kommunen)	18	17	16	17	20	14	18
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.800 personer i kommunen)	16	15	13	16	10	14	23
Ensomhed # (5.300 personer i kommunen)	13	13	11	14	20	10	10
Høj score på stressskala # (11.300 personer i kommunen)	30	26	21	31	32	24	25
Daglig rygning # (3.900 personer i kommunen)	13	9	9	9	10	8	10
E-cigaretter # (700 personer i kommunen)	3	2	2	1	2	2	0
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (1.100 personer i kommunen)	3	3	4	1	6	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.000 personer i kommunen)	7	7	7	7	6	5	14
Rusdrikker ugentligt # (4.600 personer i kommunen)	12	11	15	6	14	11	6
Usundt kostmønster # (5.000 personer i kommunen)	14	12	15	9	18	10	10
Lav fysisk aktivitet # (6.800 personer i kommunen)	18	16	16	16	20	10	22
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (26.400 personer i kommunen)	62	67	72	62	82	71	37
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (12.100 personer i kommunen)	35	31	32	29	47	19	36
Inaktiv transport ** ## (7.700 personer i kommunen)	27	28	31	24	20	33	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.500 personer i kommunen)	32	30	34	26	19	32	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.400 personer i kommunen)	15	13	12	13	10	13	14
Meget generet af søvnproblemer # (5.300 personer i kommunen)	14	12	10	14	13	12	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Lyngby-Taarbæk Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	5,3	4,4	4,9	3,9	0,4	3,5	10,7
Hjertesygdom ** (1.700 personer i kommunen)	3,6	3,7	4,2	3,2	0,1	1,6	11,9
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,1	1,9	0,1	1,0	6,3
Kræft *** (2.000 personer i kommunen)	3,7	4,3	3,7	4,8	0,3	2,8	11,7
KOL * (2.400 personer i kommunen)	4,7	5,3	4,4	6,1	=	4,2	13,5
Astma ** (2.900 personer i kommunen)	6,1	6,3	5,6	7,0	4,4	6,2	8,8
Allergi – selvrapporeret ## (13.400 personer i kommunen)	31,3	31,6	28,8	34,3	30,4	36,9	22,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,7	1,8	1,8	1,8	0,5	1,5	3,7
Slidgigt – selvrapporeret # (7.600 personer i kommunen)	19,2	18,0	12,9	22,9	0,0	15,3	43,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.700 personer i kommunen)	12,7	11,0	10,4	11,7	2,9	11,1	20,1
Knogleskørhed ** (1.500 personer i kommunen)	2,7	3,4	1,0	5,6	=	1,2	11,6
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.200 personer i kommunen)	16,8	14,5	9,5	19,4	15,9	17,7	7,1
Depression ** (2.900 personer i kommunen)	6,4	6,2	4,5	7,9	3,8	6,0	9,6
Angst ** (1.500 personer i kommunen)	3,6	3,2	2,2	4,1	3,6	3,3	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,4	3,5	2,8	4,0			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Lyngby-Taarbæk Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.100 personer i kommunen)	5	5	6	4	5	5	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.900 personer i kommunen)	15	13	12	15	9	12	20
Ensomhed ## (3.200 personer i kommunen)	8	7	6	8	13	6	4
Høj score på stressskala # (8.800 personer i kommunen)	25	21	16	25	27	17	21
Daglig rygning # (5.300 personer i kommunen)	16	12	12	12	14	12	11
E-cigaretter ## (700 personer i kommunen)	3	2	3	1	3	1	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.700 personer i kommunen)	8	9	10	7	11	6	11
Rusdrikker ugentligt # (5.600 personer i kommunen)	14	13	19	7	21	11	7
Usundt kostmønster # (4.200 personer i kommunen)	12	10	12	8	9	7	16
Lav fysisk aktivitet ## (7.300 personer i kommunen)	19	17	17	17	17	13	25
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (27.000 personer i kommunen)	64	67	71	62	79	71	39
Skærmtid – 4 timer eller mere # (11.400 personer i kommunen)	31	29	29	28	36	20	39
Inaktiv transport ** ## (5.700 personer i kommunen)	20	21	20	21	11	26	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.700 personer i kommunen)	31	29	35	24	19	34	33
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.800 personer i kommunen)	13	9	10	7	6	10	11
Meget generet af søvnproblemer # (5.500 personer i kommunen)	13	12	9	16	14	10	16

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Lyngby-Taarbæk Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	5,1	4,5	5,0	4,0	0,5	3,4	11,1
Hjertesygdom ** (1.900 personer i kommunen)	4,1	4,3	4,6	4,1	=	2,0	14,0
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	1,9	1,9	1,9	0,1	0,8	6,0
Kræft *** (1.700 personer i kommunen)	3,4	3,9	3,4	4,4	0,3	2,8	10,4
KOL * (2.100 personer i kommunen)	4,6	4,8	4,1	5,4	=	4,1	11,5
Astma ** (2.700 personer i kommunen)	6,0	6,1	5,3	6,7	4,3	6,0	8,3
Allergi – selvrapporeret ## (11.700 personer i kommunen)	29,2	27,5	24,2	30,5	24,9	31,8	21,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,6	1,7	1,7	1,8	0,5	1,5	3,6
Slidgigt – selvrapporeret # (7.300 personer i kommunen)	18,0	16,9	11,0	22,7	1,3	15,4	40,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.200 personer i kommunen)	11,6	9,7	8,8	10,6	3,2	10,7	15,8
Knogleskørhed ** (1.700 personer i kommunen)	2,7	3,8	1,1	6,2	0,1	1,4	12,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.500 personer i kommunen)	16,0	12,9	7,8	17,9	15,1	14,1	7,3
Depression ** (3.300 personer i kommunen)	7,1	7,4	5,2	9,4	4,2	7,1	11,6
Angst ** (1.400 personer i kommunen)	3,0	3,0	2,1	3,9	2,9	3,1	3,1
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,6	4,0	3,0	4,6			4,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Lyngby-Taarbæk Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.200 personer i kommunen)	13	12	11	14	5	11	22
Høj score på stressskala # (7.700 personer i kommunen)	21	19	16	22	24	16	20
Daglig rygning # (4.000 personer i kommunen)	15	9	10	9	10	10	8
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.000 personer i kommunen)	10	10	12	7	12	7	13
Rusdrikker ugentligt # (5.600 personer i kommunen)	15	13	19	8	26	11	6
Usundt kostmønster # (3.500 personer i kommunen)	10	9	12	6	14	5	11
Lav fysisk aktivitet # (5.400 personer i kommunen)	15	13	11	15	9	10	24
Inaktiv transport ** ## (5.900 personer i kommunen)	22	22	27	18	12	29	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.800 personer i kommunen)	30	28	35	23	20	30	32
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.300 personer i kommunen)	11	8	8	8	3	8	12
Meget generet af søvnproblemer # (3.900 personer i kommunen)	11	9	8	11	8	9	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Lyngby-Taarbæk Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	4,9	4,4	4,9	3,9	0,6	3,4	10,6
Hjertesygdom ** (2.000 personer i kommunen)	4,3	4,6	4,8	4,4	0,1	2,1	14,6
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	1,9	1,9	1,9	=	1,0	5,9
Kræft *** (1.600 personer i kommunen)	3,2	3,6	3,2	4,0	0,3	2,6	9,4
KOL * (1.800 personer i kommunen)	4,3	4,2	3,7	4,8	=	3,8	9,7
Astma ** (2.600 personer i kommunen)	6,0	6,0	5,2	6,7	4,4	5,9	7,9
Allergi – selvrapporeret ## (10.400 personer i kommunen)	27,5	25,1	22,3	27,7	20,8	30,1	19,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,4	1,5	1,3	1,6	0,5	1,2	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (7.600 personer i kommunen)	17,6	18,4	13,9	22,3	2,9	13,4	44,7
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.900 personer i kommunen)	12,2	11,9	12,3	11,6	7,2	11,6	17,6
Knogleskørhed ** (1.700 personer i kommunen)	2,6	3,8	1,0	6,4	=	1,5	12,7
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.700 personer i kommunen)	13,5	11,4	6,7	15,4	13,1	13,6	5,0
Depression ** (3.700 personer i kommunen)	8,1	8,5	5,9	10,8	4,5	8,4	13,0
Angst ** (1.200 personer i kommunen)	2,7	2,8	2,0	3,6	2,3	3,0	3,1
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,7	4,0	2,9	4,7			4,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Lyngby-Taarbæk Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.600 personer i kommunen)	14	11	10	13	7	9	22
Høj score på stressskala ## (7.200 personer i kommunen)	22	18	13	22	17	17	21
Daglig rygning # (5.800 personer i kommunen)	19	14	15	13	14	15	13
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.800 personer i kommunen)	13	12	14	10	15	10	12
Usundt kostmønster # (3.600 personer i kommunen)	10	9	11	7	13	7	10
Lav fysisk aktivitet # (5.600 personer i kommunen)	14	14	14	14	14	9	23
Inaktiv transport ** ## (6.200 personer i kommunen)	24	24	25	22	13	30	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.000 personer i kommunen)	30	29	37	22	17	35	31
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.400 personer i kommunen)	11	8	9	8	5	9	11
Meget generet af søvnproblemer # (4.100 personer i kommunen)	11	10	9	11	13	10	7

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Lyngby-Taarbæk Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	4,2	3,8	4,3	3,4	0,6	3,1	8,9
Hjertesygdom ** (2.000 personer i kommunen)	4,3	4,8	4,9	4,7	0,1	2,1	15,6
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,2	2,1	=	1,1	6,7
Kræft *** (1.400 personer i kommunen)	2,9	3,4	2,8	3,9	0,4	2,5	8,6
KOL * (1.600 personer i kommunen)	3,9	3,8	3,3	4,2	=	3,5	8,7
Astma ** (2.500 personer i kommunen)	6,0	5,8	5,2	6,4	4,3	5,6	7,9
Allergi – selvrapporeret ## (9.800 personer i kommunen)	26,7	25,0	21,6	28,1	28,4	27,4	15,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,3	1,4	1,2	1,5	0,4	1,2	2,7
Slidgigt – selvrapporeret # (6.600 personer i kommunen)	17,7	16,2	13,1	18,9	1,4	14,1	39,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.700 personer i kommunen)	12,5	9,1	9,7	8,6	5,3	9,5	13,1
Knogleskørhed ** (1.400 personer i kommunen)	2,2	3,3	0,8	5,5	=	1,3	11,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.500 personer i kommunen)	15,6	13,6	7,6	18,9	17,7	15,0	5,0
Depression ** (3.400 personer i kommunen)	7,7	8,1	5,8	10,2	4,3	8,0	12,7
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	2,4	2,6	1,9	3,2	1,7	2,8	3,1
Demens – blandt 65+ årige ** (500 personer i kommunen)	4,0	4,7	3,8	5,3			4,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.