

Tårnby Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.300 personer i kommunen)	5	7	8	7	10	6	8
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (5.200 personer i kommunen)	18	17	19	15	18	14	23
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.900 personer i kommunen)	16	17	15	20	9	15	30
Ensomhed # (3.800 personer i kommunen)	13	12	11	13	22	9	12
Høj score på stressskala # (9.500 personer i kommunen)	30	31	26	35	40	28	28
Daglig rygning # (5.100 personer i kommunen)	13	16	17	16	17	17	14
E-cigaretter # (1.500 personer i kommunen)	3	5	5	5	9	5	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (500 personer i kommunen)	3	2	2	1	5	1	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.800 personer i kommunen)	7	6	7	5	5	4	9
Rusdrikker ugentligt # (2.700 personer i kommunen)	12	9	13	4	7	10	7
Usundt kostmønster # (5.700 personer i kommunen)	14	19	23	15	20	18	19
Lav fysisk aktivitet # (6.200 personer i kommunen)	18	20	20	20	21	15	29
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (15.600 personer i kommunen)	62	54	56	53	65	59	32
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (10.600 personer i kommunen)	35	38	38	37	47	31	45
Inaktiv transport ** ## (5.400 personer i kommunen)	27	29	33	25	22	33	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.400 personer i kommunen)	32	37	45	30	28	39	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.900 personer i kommunen)	15	19	20	18	14	21	19
Meget generet af søvnproblemer # (5.100 personer i kommunen)	14	16	14	18	21	15	15

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Tårnby Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.200 personer i kommunen)	5,3	6,6	7,3	5,8	0,8	5,0	15,6
Hjertesygdom ** (1.600 personer i kommunen)	3,6	4,6	5,5	3,8	0,2	2,4	14,1
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,7	2,2	0,1	1,5	6,8
Kræft *** (1.500 personer i kommunen)	3,7	4,5	4,1	4,9	0,3	3,0	12,1
KOL * (1.900 personer i kommunen)	4,7	5,6	5,1	6,1	=	4,3	14,3
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,1	6,0	5,0	7,0	4,3	6,0	7,7
Allergi – selvrapporeret ## (9.700 personer i kommunen)	31,3	31,0	30,6	31,4	36,0	33,6	21,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,7	1,9	1,8	2,0	0,7	1,8	3,2
Slidgigt – selvrapporeret # (7.700 personer i kommunen)	19,2	24,4	20,1	28,6	3,0	21,4	50,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.400 personer i kommunen)	12,7	14,1	13,9	14,2	5,3	15,0	20,2
Knogleskørhed ** (1.100 personer i kommunen)	2,7	3,2	1,1	5,2	=	1,2	10,7
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.800 personer i kommunen)	16,8	18,5	12,2	24,7	26,0	18,9	10,9
Depression ** (2.200 personer i kommunen)	6,4	6,4	4,7	8,1	4,5	6,3	8,8
Angst ** (1.300 personer i kommunen)	3,6	3,7	2,7	4,7	5,2	3,5	2,8
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,4	3,3	3,0	3,6			3,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Tårnby Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.900 personer i kommunen)	5	6	7	5	5	5	7
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.400 personer i kommunen)	15	19	17	21	8	20	26
Ensomhed ## (2.200 personer i kommunen)	8	7	7	6	8	6	5
Høj score på stressskala # (9.000 personer i kommunen)	25	27	24	30	34	25	25
Daglig rygning # (5.800 personer i kommunen)	16	17	18	16	20	17	13
E-cigaretter ## (1.200 personer i kommunen)	3	4	4	3	5	4	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.300 personer i kommunen)	8	7	8	6	7	5	10
Rusdrikker ugentligt # (3.600 personer i kommunen)	14	11	15	7	14	10	10
Usundt kostmønster # (6.000 personer i kommunen)	12	18	22	15	19	16	22
Lav fysisk aktivitet ## (6.900 personer i kommunen)	19	21	20	21	24	16	27
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (18.600 personer i kommunen)	64	60	59	60	74	60	44
Skærmtid – 4 timer eller mere # (10.900 personer i kommunen)	31	36	41	31	45	28	45
Inaktiv transport ** ## (5.100 personer i kommunen)	20	25	29	20	17	28	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.400 personer i kommunen)	31	37	42	32	27	39	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.600 personer i kommunen)	13	17	19	15	12	19	16
Meget generet af søvnproblemer # (5.100 personer i kommunen)	13	15	13	17	16	15	14

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Tårnby Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.200 personer i kommunen)	5,1	6,3	7,2	5,5	0,7	4,9	15,6
Hjertesygdom ** (1.800 personer i kommunen)	4,1	5,3	5,9	4,8	0,2	3,1	15,9
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,6	2,3	0,1	1,4	7,2
Kræft *** (1.400 personer i kommunen)	3,4	3,9	3,6	4,3	0,4	2,7	10,5
KOL * (1.800 personer i kommunen)	4,6	5,3	4,6	5,9	=	4,1	13,6
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,0	5,8	4,7	6,7	4,2	5,5	7,9
Allergi – selvrapporeret ## (9.400 personer i kommunen)	29,2	28,8	24,0	33,4	27,7	32,4	21,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,6	1,8	1,7	1,9	0,6	1,6	3,5
Slidgigt – selvrapporeret # (7.900 personer i kommunen)	18,0	23,6	17,9	29,0	0,9	22,0	51,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.600 personer i kommunen)	11,6	13,8	14,0	13,6	5,0	14,8	20,5
Knogleskørhed ** (1.100 personer i kommunen)	2,7	3,2	1,1	5,2	=	1,2	11,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.700 personer i kommunen)	16,0	17,9	10,5	25,0	19,3	20,8	9,3
Depression ** (2.400 personer i kommunen)	7,1	6,9	4,9	8,8	4,3	7,0	9,4
Angst ** (1.000 personer i kommunen)	3,0	2,9	2,0	3,7	3,5	2,9	2,3
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,6	3,7	2,8	4,4			3,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Tårnby Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.800 personer i kommunen)	13	15	12	17	6	13	25
Høj score på stressskala # (5.300 personer i kommunen)	21	17	12	22	21	16	16
Daglig rygning # (5.500 personer i kommunen)	15	17	17	16	10	20	14
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.400 personer i kommunen)	10	8	10	6	9	7	10
Rusdrikker ugentligt # (3.000 personer i kommunen)	15	9	12	7	13	10	5
Usundt kostmønster # (4.200 personer i kommunen)	10	13	19	9	14	12	16
Lav fysisk aktivitet # (5.000 personer i kommunen)	15	16	14	17	12	14	22
Inaktiv transport ** ### (4.200 personer i kommunen)	22	21	30	14	15	24	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.500 personer i kommunen)	30	36	43	29	20	39	42
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.100 personer i kommunen)	11	13	12	14	3	16	14
Meget generet af søvnproblemer # (3.600 personer i kommunen)	11	11	9	13	9	12	10

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Tårnby Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	4,9	5,9	6,7	5,2	0,7	4,8	14,1
Hjertesygdom ** (1.700 personer i kommunen)	4,3	5,0	5,7	4,5	=	2,8	15,5
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,5	2,6	2,3	=	1,2	7,9
Kræft *** (1.300 personer i kommunen)	3,2	3,7	3,4	4,1	0,3	2,6	10,1
KOL * (1.600 personer i kommunen)	4,3	4,9	4,1	5,6	=	3,9	12,3
Astma ** (1.900 personer i kommunen)	6,0	5,8	4,7	6,7	4,3	5,4	8,1
Allergi – selvrapporeret ## (9.100 personer i kommunen)	27,5	28,9	29,8	28,0	35,8	29,0	20,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,4	1,5	1,3	1,7	0,4	1,3	3,0
Slidgigt – selvrapporeret # (7.400 personer i kommunen)	17,6	23,4	19,0	27,1	0,0	22,2	46,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.000 personer i kommunen)	12,2	15,6	17,8	13,7	6,0	17,0	21,0
Knogleskørhed ** (1.000 personer i kommunen)	2,6	2,9	1,0	4,7	=	1,3	9,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	13,5	14,2	9,6	18,2	14,3	16,9	7,8
Depression ** (2.400 personer i kommunen)	8,1	7,1	5,0	9,1	4,5	7,1	10,0
Angst ** (800 personer i kommunen)	2,7	2,3	1,5	3,1	2,5	2,4	2,0
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,7	4,2	4,0	4,4			4,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Tårnby Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.100 personer i kommunen)	14	16	14	17	6	15	29
Høj score på stresskala ## (7.700 personer i kommunen)	22	25	19	30	27	23	29
Daglig rygning # (7.000 personer i kommunen)	19	22	23	21	20	24	19
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.600 personer i kommunen)	13	11	16	8	13	11	11
Usundt kostmønster # (3.800 personer i kommunen)	10	12	15	10	15	11	14
Lav fysisk aktivitet # (5.100 personer i kommunen)	14	16	16	16	12	13	26
Inaktiv transport ** ## (5.300 personer i kommunen)	24	26	34	18	18	30	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.000 personer i kommunen)	30	35	43	28	20	39	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.500 personer i kommunen)	11	14	14	14	8	15	17
Meget generet af søvnproblemer # (3.900 personer i kommunen)	11	12	8	16	9	12	16

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Tårnby Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Tårnby Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	4,2	5,0	5,7	4,4	0,5	4,1	12,2
Hjertesygdom ** (1.700 personer i kommunen)	4,3	5,1	5,8	4,5	=	2,8	16,2
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,5	2,7	2,3	=	1,4	7,7
Kræft *** (1.100 personer i kommunen)	2,9	3,4	3,0	3,8	0,3	2,6	8,8
KOL * (1.300 personer i kommunen)	3,9	3,9	3,4	4,5	=	3,3	9,8
Astma ** (2.100 personer i kommunen)	6,0	6,4	5,2	7,5	5,0	5,8	9,5
Allergi – selvrapporeret ## (8.000 personer i kommunen)	26,7	26,4	23,1	29,6	31,7	27,2	17,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,3	1,4	1,3	1,5	0,5	1,3	2,7
Slidgigt – selvrapporeret # (7.400 personer i kommunen)	17,7	23,9	17,7	29,2	3,2	22,2	49,9
Rygsygdom – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	12,5	14,5	14,7	14,3	7,5	16,3	16,9
Knogleskørhed ** (800 personer i kommunen)	2,2	2,4	0,8	4,0	=	1,3	7,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.600 personer i kommunen)	15,6	18,2	8,9	26,3	21,3	19,9	10,7
Depression ** (2.300 personer i kommunen)	7,7	7,2	5,0	9,2	4,3	7,2	10,4
Angst ** (700 personer i kommunen)	2,4	2,0	1,2	2,8	2,0	2,0	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	4,0	4,8	4,4	5,1			4,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.